

種類	ワクチン	乳児期												幼児期						学童期～								
		6 週 0 日 後	2 ヶ 月	3 ヶ 月	14 週 6 日 後	4 ヶ 月	5 ヶ 月	24 週 0 日 後	6 ヶ 月	7 ヶ 月	32 週 0 日 後	8 ヶ 月	9 ヶ 月 ～	12 ヶ 月 ～	15 ヶ 月 ～	18 ヶ 月 ～	2 歳	3 歳	4 歳	5 歳	6 歳	7 歳	8 歳	9 歳	10 歳	11 歳	12 歳 ～	
定期 接 種	ロタウイルス (1価:ロタリックス)		①	②	※			※ロタウイルスの予防接種はどちらの場合も、1回目は出生14週6日後までに行い、2回目以降は同一のワクチンを接種してください。																				
	ロタウイルス (5価:ロタテック)		①	②	※	③																						
	ヒブ(Hib) ※注1		①	②		③	7～13月の間隔						④															
	小児用肺炎球菌 ※注1		①	②		③	60日以上の間隔						④															
	B型肝炎 ※注2		①	②	139日以上の間隔				③																			
	四種混合 (DPT-IPV)			①		②	③	12～18月の間隔						④														
	BCG						①																					
	麻しん・風しん (MR)													①				② (年長児)										
	水痘(水ぼうそう) ※注3													①	②													
	日本脳炎 ※注4																			① ②	③				④9～12歳 (2期)			
	二種混合(DT)																										①11～12歳 (2期)	
	子宮頸がん(HPV) ※注5																										小学6年生 ～高校1年生 ①②③	
任意 接 種	インフルエンザ													毎年①、②(中学生は①) (10月～2月)														