

令和6年度 諫早市予防接種（子ども）

対象年齢者

無料

次の予防接種は指定の医療機関で年間を通じて接種できます。
お子様の健康状態が良いときにお受けください。

予防接種名	標準的な接種時期（対象年齢）		標準的な接種方法等	他の予防接種までの間隔
ロタウイルス	ロタリックス	標準で1回目は生後2月～出生14週6日後までに行う (出生6週0日後～出生24週0日後までの間)	27日以上の間隔で 2回接種	制限なし
	ロタテック	標準で1回目は生後2月～出生14週6日後までに行う (出生6週0日後～出生32週0日後までの間)	27日以上の間隔で 3回接種	制限なし
小児用肺炎球菌	【初回】標準で1回目は生後2月～7月に至るまで（生後2月～60月に至るまで）		27日以上の間隔で 3回接種	制限なし
	【追加】初回終了後60日以上の間隔をおいて生後12月～15月に至るまで (生後2月～60月に至るまで)		1回接種	
B型肝炎	標準で生後2月～9月に至るまで（生後1歳に至るまで）		27日以上の間隔で 2回接種 1回目終了後139日 以上の間隔で1回接種	制限なし
ヒブ(Hib)	【初回】標準で1回目は生後2月～7月に至るまで（生後2月～60月に至るまで）		27日以上の間隔で 3回接種	制限なし
	【追加】標準で初回終了後7月～13月の間隔をおく（生後2月～60月に至るまで）		1回接種	
四種混合	【1期初回】標準で生後2月～12月に達するまで（生後2月～90月に至るまで）		20日以上の間隔で 3回接種	制限なし
	【1期追加】初回終了後12月～18月の間隔をおく（生後2月～90月に至るまで）		1回接種	
五種混合	【初回】標準で1回目は生後2月～7月に至るまで（生後2月～90月に至るまで）		20日以上の間隔で 3回接種	制限なし
	【追加】初回終了後6月～18月の間隔をおく（生後2月～90月に至るまで）		1回接種	
BCG	標準で生後5月～8月に至るまで（生後1歳に至るまで）		1回接種	●
麻しん及び風しん(MR)	【1期】 生後12月～24月に至るまで 【2期】 5歳以上7歳未満で小学校就学前の1年間にある者 (対象者：平成30年4月2日～平成31年4月1日生まれ)		麻しん風しん混合ワクチンを各期1回接種	●
水痘	【初回】標準で生後12月～15月に達するまで（生後12月～36月に至るまで）		1回接種	●
	【追加】初回接種後6月～12月の間隔をおく（生後12月～36月に至るまで）		1回接種	
日本脳炎	【1期初回】標準で3歳（生後6月～90月に至るまで）		標準的には6日～28日 の間隔で2回接種	制限なし
	【1期追加】1期初回終了後標準的に概ね1年後 標準で4歳(生後6月～90月に至るまで)		1回接種	
	【2期】標準で小学4年生（9歳～13歳未満）		1回接種	
	〈特例対象者〉※20歳未満(H19.4.1生まれまでの未接種の方は接種可（詳細はお尋ねください）			
二種混合	標準で小学6年生（11歳～13歳未満）		1回接種	制限なし
子宮頸がん予防ワクチン(HPV)	標準で中学1年生に相当する女性（対象者：平成20年4月2日～平成25年4月1日生まれの女性） 〈特例対象者〉平成9年4月2日～平成20年4月1日生まれの未接種の女性（詳細はお尋ねください）			

●：生ワクチン（BCG、麻しん及び風しん、水痘）を接種後、他の生ワクチンを接種する場合は、27日以上の間隔が必要です。

※新型コロナワクチンは、前後13日以上の間隔が必要ですが、その他のワクチンは間隔の制限がありません。

《 注意とお願い 》

- ① 接種する日時は、あらかじめ医療機関とご相談ください。
- ② 保護者同伴で、必ず母子健康手帳をお持ちください。
- ③ 「予診票」は、必ず保護者が責任を持って記入してください。
- ④ 医療機関で検温と診察をいたしますので、診察を受けやすい服装でお願いします。
- ⑤ ロタウイルスワクチンはロタリックス、ロタテックのどちらかを選択し、同一ワクチンで接種を完了してください。