

種類	ワクチン	乳児期											幼児期						学童期～										
		6週0日後	2ヶ月	3ヶ月	14週6日後	4ヶ月	5ヶ月	24週0日後	6ヶ月	7ヶ月	32週0日後	8ヶ月	9ヶ月	12ヶ月	15ヶ月	17ヶ月	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳		
定期接種	ロタウイルス (ロタリックス)		①	②	※	※ロタウイルスの予防接種はどちらの場合も、1回目は出生14週6日後までに行い、2回目以降は同一のワクチンを接種してください。																							
	ロタウイルス (ロタテック)		①	②	※	③																							
	小児用肺炎球菌 ※注1		①	②		③	60日以上の間隔					④																	
	B型肝炎 ※注2		①	②	139日以上の間隔				③																				
	ヒブ(Hib) ※注1		①	②		③	7～13月の間隔					④																	
	五種混合 (DPT-IPV-Hib)		①	②		③	6～18月の間隔					④																	
	BCG							①																					
	麻しん及び風しん (MR) ※注3												①			② (年長児)													
	水痘(水ぼうそう) ※注4												①	②															
	日本脳炎 ※注5																	①	②	③				④9～12歳 (2期)					
	二種混合(DT)																								①11～12歳 (2期)				
	子宮頸がん(HPV)																								小学6年生 ～高校1年生 ①②③				
	RSウイルスワクチン (母子免疫ワクチン)	妊娠週数28週0日～36週6日に1回接種																											
任意接種	インフルエンザ												毎年【注射】①、②(中学生は①) 【点鼻液】① (10月～2月)																