

■市が実施する予防接種の標準的なスケジュール例

丸囲み数字（①、②など）は、ワクチンの種類毎に接種の回数と、標準的な接種時期の例を示しています。

丸囲み数字間に矢印があるものは、接種間隔を誤りやすいので、特にご注意ください。

塗りつぶし部分以外は、定期接種の対象外の年齢です（特例の対象者を除く）。

ロタウイルスの予防接種は、令和2年8月1日以後に生まれたお子さまが、令和2年10月1日以後に接種する分から対象です。

種類	ワクチン	乳児期										幼児期						学童期～										
		6週0日後	2ヶ月	3ヶ月	14週6日後	4ヶ月	5ヶ月	24週0日後	6ヶ月	7ヶ月	32週0日後	8ヶ月	9ヶ月	12ヶ月	15ヶ月	18ヶ月	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	
定期接種	ロタウイルス (ロタリックス)		①	②	※											※ロタウイルスの予防接種はどちらの場合も、1回目は出生14週6日後までに行い、2回目以降は同一のワクチンを接種してください。												
	ロタウイルス (ロタテック)		①	②	※	③																						
	ヒブ(Hib)		①	②		③	7～13月の間隔					④																
	小児用肺炎球菌		①	②		③	60日以上の間隔					④																
	B型肝炎		①	②	139日以上の間隔			③																				
	BCG					①																						
	四種混合 (DPT-IPV)		①		②	③			12～18月の間隔					④														
	水痘(水ぼうそう)												①	②														
	麻しん・風しん (MR)												①			②												
	日本脳炎												①		②	③												
	二種混合(DT)																							①11～12歳 (2期)				
	子宮頸がん(HPV)																							小学6年生 ～高校1年生 ①②③				
任意接種	インフルエンザ												毎年①、②(中学生は①) (10月～2月)															